

糸リフト（スレッドリフト）に関する説明書・同意書

❖ 糸リフト（スレッドリフト）について

デザイン性に優れた糸を顔の側面から挿入し、フェイスラインやほうれい線のたるみを改善します。挿入した糸によりコラーゲンやエラスチンの生成が促進される為、肌のハリや弾力アップが期待でき、将来的なたるみ予防にもなります。

❖ 適応症例

顔全体のリフトアップ、フェイスラインのたるみ、口元のたるみ、肌のハリや弾力、小顔効果

❖ 治療方法と経過

洗顔後、お顔の消毒をし 局所麻酔をしてからデザインに合わせて糸を挿入していきます。局所麻酔の際にチクチクした痛み、麻酔がしみるような痛みがあります。施術時は押されるような痛みがある場合がございますが、お痛みが強い際は適宜麻酔を追加しますのでお声がけ下さい。施術時間は約30分程度になります。

❖ ダウンタイム・リスク

腫れ・痛み: 個人差があり、腫れは1週間程、痛みは3日～1週間程出る場合があります。但し、徐々に落ち着きます。

内出血: まれに治療部位に内出血が生じる場合があります。但し、1～2週間程で徐々に消えていきます。

傷跡: 髪の毛に隠れるところから糸を挿入する為、施術後に目立つ事は少ないです。
但し、針で刺した跡がしばらく残ります。1ヶ月～3ヶ月程で徐々に薄くなります。

感染: 針穴が塞がるまでの間に皮膚の常在菌が入り込むと感染を起こす可能性があります。

※ 挿入した糸の影響により、お顔に若干の引きつれ、凹みが発生することがあります。

※ まれに糸の挿入箇所や口の中から糸が出てくる場合があります。当院にて適切に処置させていただきますのでご来院下さい。

❖ 注意事項

・施術後、定着していない段階で口を大きく開けると、口の中で引っかかっているコグ(トゲ)が外れる可能性がある為、お控え下さい。

・飲酒・激しい運動・サウナ等はお控え下さい。

・糸の位置が動く可能性や、内出血が長引く可能性がある為、お顔にはなるべく触れないで下さい。

・洗顔・シャワー浴は首から下は当日より可能、洗髪は翌日から可能です。

・入浴(湯船に浸かる)は当日と翌日はお控え下さい。

・お化粧品は、翌日から可能ですが、挿入部分は避けて下さい。

・マッサージ・ヘアカラーは1ヶ月間程控えて下さい。

・抗生剤、痛み止め、胃薬をお出ししています。服用によりなにか異常があれば服用を中止してお電話下さい。

※ 針刺し等、事故による感染予防のために必要に応じて採血のご協力をお願いする場合がございます。

✿ 治療が受けられない方・医師の相談が必要な方

- ・18歳未満の方
- ・妊娠・授乳中の方
- ・てんかんを持病にお持ちの方
- ・施術希望部位に感染性の皮膚疾患のある方
- ・重度の糖尿病の方
- ・膠原病の方
- ・ケロイド体質の方
- ・血液凝固異常の素因を持っている方
- ・抗凝固薬・抗血小板薬を服用中の方
- ・麻酔薬・抗生剤でのアレルギーのある方
- ・他院で溶けないスレッドリフト(金の糸等)をされたことがある方

治療中は必ず担当医師の指導に従って下さい。医師の指導に従わない場合、十分な治療効果を得られないだけでなく、障害が発生する場合があります。また、治療の過程で以上異常を感じた場合は必ず医師や看護師に報告し、必要時は医師の診察を受けその指示にしたがって下さい。また、当院では治療経過のためにカルテ用の写真撮影を行っております。写真撮影の同意がいただけない場合は経過確認が十分にできないため、施術効果に関するお問い合わせや、施術の影響による合併症(皮膚トラブル・神経症状など)が生じた場合などについて、適切な処置ができない可能性があります。また、合併症が生じた場合の治療費は別途発生いたします。

糸リフト(スレッドリフト)に関する同意書

私は上記の糸リフト(スレッドリフト)の作用・副作用および安全性について十分に理解し、糸リフト(スレッドリフト)を受けること、写真撮影に同意します。

年 月 日

患者氏名

お預かりした個人情報は「にしたんクリニック」の全ての医院で共有いたします。予めご了承下さい。



Nishitan Clinic
にしたんクリニック

医療法人社団直悠会 にしたんクリニック